

Индекс активности СКВ по шкале SLEDAI 2K*

Балл	Проявление	Определение	Балл	Проявление	Определение
8	Эпиприступ	Недавно возникший (последние 10 дней), исключая метаболические, инфекционные и лекарственные причины	8	Васкулит	Язвы, гангрена, болезненные узелки на пальцах, околоногтевые инфаркты и геморрагии или данные биопсии или ангиограммы подтверждающие васкулит.
8	Психоз	Нарушение способности выполнять нормальные действия в нормальном режиме вследствие выраженного изменения восприятия действительности, включая галлюцинации, бессвязность, значительное снижение ассоциативных способностей, истощение мыслительной деятельности, выраженное алогичное мышление; странное, дезорганизованное или катоническое поведение. Исключить подобные состояния, вызванные уреимией или ЛС	4	Артрит	Более 2 болезненных суставов с признаками воспаления (болезненность, отек или выпот).
8	Органические мозговые синдромы	Нарушение умственной деятельности с нарушением ориентации, памяти или других интеллектуальных способностей с острым началом и нестойкими клиническими проявлениями, включая затуманенность сознания со сниженной способностью к концентрации и неспособностью сохранять внимание к окружающему, плюс минимум 2 из следующих: нарушение восприятия, бессвязная речь, бессонница или сонливость в дневное время, снижение или повышение психомоторной активности. Исключить метаболические, инфекционные и лекарственные воздействия.	4	Миозит	Проксимальная мышечная боль/слабость ассоциированная с повышением уровнем креатинфосфокиназы/альдолазы, или ЭМГ или биопсии, подтверждающие миозит.
8	Зрительные нарушения	Изменения в глазу или на сетчатке, включая клеточные тельца, кровоизлияния, серозный экссудат или геморрагии в сосудистой оболочке или неврит зрительного нерва, склерит, эписклерит. Исключить случаи подобных изменений при гипертензии, инфекции и лекарственных воздействиях.	4	Цилиндрурия	Зернистые или эритроцитарные цилиндры
8	Расстройства со стороны черепно-мозговых нервов	Впервые возникшая чувствительная или двигательная невропатия черепно-мозговых нервов, включая головокружение, развившееся вследствие волчанки.	4	Гематурия	>5 эритроцитов в поле зрения, исключая камни, инфекционные и другие причины
8	Головная боль	Выраженная персистирующая головная боль (может быть мигренозной), не отвечающая на наркотические анальгетики.	4	Протеинурия	Острое начало или недавнее появление в количестве >0.5г в сутки
8	Нарушение мозгового кровообращения	Впервые возникшее, исключая таковое, вследствие атеросклероза или гипертензии.	4	Пиурия	>5 лейкоцитов в поле зрения, исключая инфекционные причины
			2	Высыпания	Новые или продолжающиеся высыпания на коже воспалительного характера
			2	Алопеция	Впервые возникшее или продолжающееся повышенное очаговое или диффузное выпадение волос вследствие активности волчанки
			2	Язвы слизистых оболочек	Впервые возникшее или продолжающееся изъязвление слизистых оболочек рта и носа вследствие активности волчанки
			2	Плеврит	Боль в грудной клетки с шумом трения плевры, или выпотом, или утолщение плевры вследствие волчанки
			2	Перикардит	Перикардальная боль с одним из следующих признаков: шум трения перикарда, ЭКГ подтверждение
			2	Низкий комплемент	Снижение CH50, C3 или C4 ниже границы нормы тестирующей лаборатории
			2	Повышение уровня анти-ДНК	>25% связывание по методу Farr или превышение нормальных значений тестирующей лаборатории
			1	Тромбоцитопения	<100 000клеток/мм ³
			1	Лейкопения	<3000 клеток в мм ³ , исключая лекарственные причины



Активность заболевания оценивается по индексу SLEDAI 2K по следующей градации

- SLEDAI (SLE Disease Activity Index 2000) - индекс активности СКВ 2000 и его модификации.
- Индекс включает в себя 24 (16 клинических и 8 лабораторных) показателя СКВ, которым присваивается балльная оценка от 1 до 8.
- Для оценки активности по SLEDAI необходимо отмечать признаки СКВ, которые присутствовали у пациента в течение 10 предшествующих осмотру дней.
- Максимально возможное значение SLEDAI составляет 105 баллов.

	нет активности (SLEDAI 0 баллов)
	степень - низкая активность (SLEDAI 1–5 баллов)
	степень - средняя степень активности (SLEDAI 6–10 баллов)
	степень - высокая степень активности (SLEDAI 11–19 баллов)
	степень - очень высокая степень активности (SLEDAI >20 баллов)

Материал предназначен для специалистов здравоохранения

Подготовлен при поддержке «Представительства ЗАК Астра Зенека Юкей лимитед»

Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Кунаева 77, оф. 101, тел: 8 (727) 232 1415

www.astrazeneca.kz

KZ-3278 дата одобрения: апрель 2024г. дата истечения: апрель 2025г.

1. Bernatsky S. et al. Associations between Ambient Fine Particulate Levels and Disease Activity in Patients with Systemic Lupus Erythematosus (SLE) [Environ Health Perspect.](https://doi.org/10.1186/1475-2875-119-1-45) 2011 Jan; 119(1): 45–49.

2. [Кучинская Е.М.](#) и др. Современные основы формализованного описания течения системной красной волчанки у детей https://journals.eco-vector.com/pediatr/article/view/6419/ru_RU;

